

Canadian  
Pari-Mutuel  
Agency



Agence  
canadienne  
du pari mutuel

# Guide d'élimination

Date de révision 3 avril 2020



Agriculture and  
Agri-Food Canada

Agriculture et  
Agroalimentaire Canada

Canada

© Sa Majesté la Reine du chef du Canada, représentée par le ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire Canada, 2020

## TABLE DES MATIÈRES

|   |   |
|---|---|
| INTRODUCTION.....                             | 3 |
| DONNÉES SUR L'ADMINISTRATION DES DROGUES..... | 5 |

### AVERTISSEMENT

Le guide d'élimination des drogues ne constitue pas une attestation, une garantie, une assurance, une promesse ou autre, que l'usage d'une de ces drogues selon les instructions donnera les résultats prévus. Agriculture et Agroalimentaire Canada n'est nullement responsable si les résultats ne sont pas les mêmes que ceux qui sont présentés ici.

L'emploi des informations contenues dans le présent document n'annule ni ne réduit la responsabilité d'un entraîneur de s'assurer qu'avant une course, le cheval n'a reçu aucune des drogues énumérées à l'Annexe du *Règlement sur la surveillance du pari mutuel* et de se plier aux dispositions de ce règlement et des règlements provinciaux sur les courses.

Les propriétaires, entraîneurs ou toute autre personne responsable ou prenant soin d'un cheval de course sont fortement encouragés à consulter leur propre vétérinaire pour obtenir des conseils et des instructions sur l'usage de toutes les drogues.

Les directives contenues dans la présente brochure s'appliquent **UNIQUEMENT** aux produits, aux doses et aux modes d'administration énoncés et **ne sont pas nécessairement compatibles avec la réglementation ou les méthodes de laboratoire des pays étrangers**. L'utilisation d'autres produits, comme les médicaments composés ayant le(s) même(s) ingrédient(s) actif(s), ou encore l'utilisation concomitante de plusieurs produits, peut entraîner une élimination des drogues non conforme aux présentes lignes directrices.

#### IMPORTANT

Chaque produit pharmaceutique dont la vente est autorisée au Canada est associé à un « numéro d'identification de drogue » (N.I.D.) qui est inscrit sur l'étiquette du produit.

L'étiquette des drogues pour utilisation en médecine vétérinaire porte la mention : « (Pour) Usage vétérinaire seulement » ou « (Pour) Usage agricole seulement ».

**LISEZ ATTENTIVEMENT LES  
ÉTIQUETTES DES PRODUITS**

## NOTES GÉNÉRALES

1. La présente brochure est fournie aux vétérinaires et aux propriétaires de chevaux à titre de renseignement. Cette édition remplace toutes les éditions précédentes.
2. Le *Règlement sur la surveillance du pari mutuel* et l'Annexe peuvent être modifiés en tout temps.
3. Le dépistage et la corroboration, dans un échantillon officiel, d'une des drogues répertoriées dans l'Annexe doivent être considérés comme des épreuves positives en vertu du *Règlement sur la surveillance du pari mutuel*.
4. L'Agence canadienne du pari mutuel est en mesure d'offrir ce Guide d'élimination uniquement à l'égard des médicaments approuvés par Santé Canada.

<http://www.agr.gc.ca/cpma> (Anglais)

<http://www.agr.gc.ca/acpm> (Français)

**1-800-268-8835**

### **ADRESSE POSTALE :**

C.P. 5904

PDF Merivale

Ottawa (Ontario) K2C 3X7

[www.cpmawebacpm.aac@canada.ca](http://www.cpmawebacpm.aac@canada.ca)

## INTRODUCTION

Agriculture et Agroalimentaire Canada (AAC), dans le cadre du Programme de contrôle des drogues équinés de l'Agence canadienne du pari mutuel (ACPM), fait des recherches sur l'élimination des drogues équinés, en vue d'aider le secteur des courses. Les sujets expérimentaux sont les juments Standardbred logées dans les écuries du Centre d'évaluation des drogues équinés d'AAC.

Il est important de souligner le caractère **approximatif** des données présentées. En effet, l'absorption et l'élimination des drogues dépendent de nombreux facteurs, notamment de la bête (âge, sexe, etc.), de son milieu de vie (alimentation, entraînement, etc.) et de la substance (dose, mélange, co-administration de drogues et/ou de suppléments, etc.). Il est à signaler que la dose varie parfois selon la préparation et le fabricant. Lisez bien l'étiquette et le mode d'emploi du produit avant de l'utiliser. Compte tenu de tous ces facteurs, chaque cheval a une vitesse de métabolisme qui lui est propre. Consultez votre vétérinaire pour obtenir des conseils et des instructions sur l'administration de drogues à votre cheval.

Le guide d'élimination n'est fourni qu'à titre d'information et ne remplace ni n'annule d'aucune façon le principe de la responsabilité de se plier au *Règlement sur la surveillance du pari mutuel* et aux règlements provinciaux sur les courses. Si ce n'est déjà fait, assurez-vous de bien connaître ces règlements.

Agriculture et Agroalimentaire Canada et les laboratoires officiels de contrôle des chevaux de courses déclinent toute responsabilité advenant que l'administration de drogues selon les quantités et les délais indiqués dans la présente publication conduise à une épreuve positive.

La page suivante décrit les renseignements généralement présentés dans la brochure pour décrire une drogue en particulier.

Nom générique (ou courant) de la drogue  
p. ex. **LIDOCAÏNE**

Type

p. ex. anesthésique local (voir glossaire)

Voie d'administration

|                                  |                              |
|----------------------------------|------------------------------|
| p. ex. Inhalateur Aeromask (AER) | Injection intraveineuse (IV) |
| Infiltration (INFIL)             | Nébulisation (NEB)           |
| Injection intra-articulaire (IA) | Orale (PO)                   |
| Injection intramusculaire (IM)   | Sublinguale (SL)             |
| Injection sous-cutanée (SC)      | Topique (TOP)                |

Posologie et guide d'élimination (GE)

|                   |                                     |
|-------------------|-------------------------------------|
| Nombre de chevaux | Dose : p. ex. 500 mg (milligrammes) |
|-------------------|-------------------------------------|

---

|                        |     |                      |
|------------------------|-----|----------------------|
| (Juments Standardbred) | 1 g | (1 gramme = 1000 mg) |
|------------------------|-----|----------------------|

Guide d'élimination

Délai d'élimination des drogues recommandé avant une course

**Exemple : Guide d'élimination = 120 heures et plus :  
À cette dose, le dépistage chez la plupart des chevaux  
serait positif au-delà de 120 heures après le dernier  
traitement.**

Souvenez-vous que ces résultats ne sont fournis qu'à titre d'indications. Ils ne s'appliquent pas nécessairement à chaque cheval auquel est administrée cette drogue.

Ces lignes directrices ne s'appliquent pas aux produits composés et ne sont pas nécessairement compatibles avec la réglementation ou les méthodes de laboratoire des pays étrangers.

Marques de commerce et autres noms

Acétylpromazine, Acétazine, Atravet, Anatron, Acéprozine, Tranozine, Tranquavet

Type

Tranquillisant

Voies d'administration

IM, IV, orale (PO)

Posologie et guide d'élimination (GE)

| #Chevaux | Produit | Dose/Voie | Administration   | GE   |
|----------|---------|-----------|------------------|------|
| 4        | Atravet | 10 mg PO  | Unique           | 24h  |
| 6        | Atravet | 10 mg PO  | 1x/jour, 3 jours | 24 h |
| 8        | Atravet | 50 mg PO  | unique           | 36 h |
| 6        | Atravet | 10 mg IM  | unique           | 36 h |
| 8        | Atravet | 25 mg IM  | unique           | 36 h |
| 6        | Atravet | 25 mg IV  | unique           | 36 h |

Souvenez-vous que ces résultats ne sont fournis qu'à titre d'indications. Ils ne s'appliquent pas nécessairement à chaque cheval auquel est administré ce médicament.

Les lignes directrices contenues dans la présente brochure ne s'appliquent pas nécessairement aux produits composés et ne sont pas nécessairement compatibles avec la réglementation ou les méthodes de laboratoire des pays étrangers.

# ACÉTAMINOPHÈNE

## Marques de commerce et autres noms

Paracétamol, Atasol, Tylenol, Exdol, Dolophen, Paraphen, Robigesic

## Type

Analgésique; Antipyrétique

## Voie d'administration

Orale (PO)

## Posologie et guide d'élimination (GE)

| #Chevaux | Produit | Dose/Voie | Administration | GE   |
|----------|---------|-----------|----------------|------|
| 4        | Atasol  | 8 g PO    | unique         | 96 h |
| 4        | Tylenol | 10 g PO   | unique         | 96 h |

Souvenez-vous que ces résultats ne sont fournis qu'à titre d'indications. Ils ne s'appliquent pas nécessairement à chaque cheval auquel est administré ce médicament.

Les lignes directrices contenues dans la présente brochure ne s'appliquent pas nécessairement aux produits composés et ne sont pas nécessairement compatibles avec la réglementation ou les méthodes de laboratoire des pays étrangers.

# ACIDE AMINOCAPROÏQUE

## Marques de commerce et autres noms

Amicar

## Type

Antifibrinolytique

## Voie d'administration

IV

## Posologie et guide d'élimination (GE)

| #Chevaux | Produit | Dose/Voie | Administration | GE   |
|----------|---------|-----------|----------------|------|
| 4        | Amicar  | 2.5 g IV  | unique         | 48 h |
| 4        | Amicar  | 5.0 g IV  | unique         | 48 h |

Souvenez-vous que ces résultats ne sont fournis qu'à titre d'indications. Ils ne s'appliquent pas nécessairement à chaque cheval auquel est administré ce médicament.

Les lignes directrices contenues dans la présente brochure ne s'appliquent pas nécessairement aux produits composés et ne sont pas nécessairement compatibles avec la réglementation ou les méthodes de laboratoire des pays étrangers.

# ACIDE ÉTHACRYNIQUE

## Marques de commerce et autres noms

Edecrin

## Type

Diurétique

## Voies d'administration

IV, orale (PO)

## Posologie et guide d'élimination (GE)

| #Chevaux | Produit | Dose/Voie | Administration | GE   |
|----------|---------|-----------|----------------|------|
| 8        | Edecrin | 50 mg IV  | unique         | 36 h |
| 4        | Edecrin | 200 mg PO | unique         | 48 h |
| 4        | Edecrin | 400 mg PO | unique         | 48 h |

Souvenez-vous que ces résultats ne sont fournis qu'à titre d'indications. Ils ne s'appliquent pas nécessairement à chaque cheval auquel est administré ce médicament.

Les lignes directrices contenues dans la présente brochure ne s'appliquent pas nécessairement aux produits composés et ne sont pas nécessairement compatibles avec la réglementation ou les méthodes de laboratoire des pays étrangers.

# ACIDE MÉCLOFÉNAMIQUE

## Marques de commerce et autres noms

Arquel

## Type

Analgésique/Anti-inflammatoire (D.A.I.N.S.)

## Voie d'administration

Orale (PO)

## Posologie et guide d'élimination (GE)

| #Chevaux | Produit | Dose/Voie | Administration   | GE   |
|----------|---------|-----------|------------------|------|
| 4        | Arquel  | 1 g PO    | unique           | 48 h |
| 4        | Arquel  | 1 g PO    | 1x/jour, 3 jours | 48 h |

Souvenez-vous que ces résultats ne sont fournis qu'à titre d'indications. Ils ne s'appliquent pas nécessairement à chaque cheval auquel est administré ce médicament.

Les lignes directrices contenues dans la présente brochure ne s'appliquent pas nécessairement aux produits composés et ne sont pas nécessairement compatibles avec la réglementation ou les méthodes de laboratoire des pays étrangers.

## ACIDE MÉFÉNAMIQUE

### Marques de commerce et autres noms

Ponstan

### Type

Analgésique/Anti-inflammatoire (D.A.I.N.S.)

### Voie d'administration

Orale (PO)

### Posologie et guide d'élimination (GE)

| #Chevaux | Produit | Dose/Voie | Administration | GE   |
|----------|---------|-----------|----------------|------|
| 8        | Ponstan | 2 g PO    | unique         | 48 h |

Souvenez-vous que ces résultats ne sont fournis qu'à titre d'indications. Ils ne s'appliquent pas nécessairement à chaque cheval auquel est administré ce médicament.

Les lignes directrices contenues dans la présente brochure ne s'appliquent pas nécessairement aux produits composés et ne sont pas nécessairement compatibles avec la réglementation ou les méthodes de laboratoire des pays étrangers.

# ACIDE TIAPROFÉNIQUE

## Marques de commerce et autres noms

Surgam

## Type

Analgésique/Anti-inflammatoire (D.A.I.N.S.)

## Voie d'administration

Orale (PO)

## Posologie et guide d'élimination (GE)

| #Chevaux | Produit | Dose/Voie | Administration | GE    |
|----------|---------|-----------|----------------|-------|
| 4        | Surgam  | 2.4 g PO  | unique         | 120 h |

Souvenez-vous que ces résultats ne sont fournis qu'à titre d'indications. Ils ne s'appliquent pas nécessairement à chaque cheval auquel est administré ce médicament.

Les lignes directrices contenues dans la présente brochure ne s'appliquent pas nécessairement aux produits composés et ne sont pas nécessairement compatibles avec la réglementation ou les méthodes de laboratoire des pays étrangers.

## ATROPINE

### Marques de commerce et autres noms

Sulfure d'Atropine

### Type

Anticholinergique

### Voie d'administration

IV

### Posologie et guide d'élimination (GE)

| #Chevaux | Produit            | Dose/Voie | Administration | GE   |
|----------|--------------------|-----------|----------------|------|
| 4        | Sulfure d'atropine | 15 mg IV  | unique         | 24 h |

Souvenez-vous que ces résultats ne sont fournis qu'à titre d'indications. Ils ne s'appliquent pas nécessairement à chaque cheval auquel est administré ce médicament.

Les lignes directrices contenues dans la présente brochure ne s'appliquent pas nécessairement aux produits composés et ne sont pas nécessairement compatibles avec la réglementation ou les méthodes de laboratoire des pays étrangers.

## Marques de commerce et autres noms

Qvar

## Type

Antiinflammatoire; Corticostéroïde synthétique

## Voie d'administration

AER

## Posologie et guide d'élimination (GE)

| #Chevaux | Produit | Dose/Voie | Administration | GE  |
|----------|---------|-----------|----------------|-----|
| 4        | Qvar    | 4 mg AER  | unique         | 48h |

Souvenez-vous que ces résultats ne sont fournis qu'à titre d'indications. Ils ne s'appliquent pas nécessairement à chaque cheval auquel est administré ce médicament.

Les lignes directrices contenues dans la présente brochure ne s'appliquent pas nécessairement aux produits composés et ne sont pas nécessairement compatibles avec la réglementation ou les méthodes de laboratoire des pays étrangers.

# BÉTAMÉTHASONE

## Marques de commerce et autres nom

Celestone Soluspan

## Type

Antiinflammatoire; Corticostéroïde synthétique

## Voie d'administration

IA

## Posologie et guide d'élimination (GE)

| #Chevaux | Produit            | Dose/Voie | Administration | GE      |
|----------|--------------------|-----------|----------------|---------|
| 4        | Celestone Soluspan | 18 mg IA  | unique         | 6 jours |

Souvenez-vous que ces résultats ne sont fournis qu'à titre d'indications. Ils ne s'appliquent pas nécessairement à chaque cheval auquel est administré ce médicament.

Les lignes directrices contenues dans la présente brochure ne s'appliquent pas nécessairement aux produits composés et ne sont pas nécessairement compatibles avec la réglementation ou les méthodes de laboratoire des pays étrangers.

## BROMURE D'IPRATROPIUM

### Marques de commerce et autres nom

Atrovent

### Type

Bronchodilatateur

### Voie d'administration

AER

### Posologie et guide d'élimination (GE)

| #Chevaux | Produit  | Dose/Voie      | Administration      | GE   |
|----------|----------|----------------|---------------------|------|
| 4        | Atrovent | 0,18 mg<br>AER | 1×/jour, 3<br>jours | 24 h |

Souvenez-vous que ces résultats ne sont fournis qu'à titre d'indications. Ils ne s'appliquent pas nécessairement à chaque cheval auquel est administrée cette drogue.

Ces lignes directrices ne s'appliquent pas aux produits composés et ne sont pas nécessairement compatibles avec la réglementation ou les méthodes de laboratoire des pays étrangers.

# BUPIVACAÏNE

## Marques de commerce et autres noms

Marcaïne

## Type

Anesthésique local

## Voie d'administration

IM

## Posologie et guide d'élimination (GE)

| #Chevaux | Produit  | Dose/Voie | Administration | GE   |
|----------|----------|-----------|----------------|------|
| 8        | Marcaïne | 50 mg IM  | unique         | 24 h |

Souvenez-vous que ces résultats ne sont fournis qu'à titre d'indications. Ils ne s'appliquent pas nécessairement à chaque cheval auquel est administré ce médicament.

Les lignes directrices contenues dans la présente brochure ne s'appliquent pas nécessairement aux produits composés et ne sont pas nécessairement compatibles avec la réglementation ou les méthodes de laboratoire des pays étrangers.

Marques de commerce et autres noms

Torbugesic

Type

Analgésique/Antitussif

Voie d'administration

IV

Posologie et guide d'élimination (GE)

| #Chevaux | Produit    | Dose/Voie | Administration | GE   |
|----------|------------|-----------|----------------|------|
| 4        | Torbugesic | 5 mg IV   | unique         | 48 h |
| 4        | Torbugesic | 20 mg IV  | unique         | 72 h |

Souvenez-vous que ces résultats ne sont fournis qu'à titre d'indications. Ils ne s'appliquent pas nécessairement à chaque cheval auquel est administré ce médicament.

Les lignes directrices contenues dans la présente brochure ne s'appliquent pas nécessairement aux produits composés et ne sont pas nécessairement compatibles avec la réglementation ou les méthodes de laboratoire des pays étrangers.

## N-BUTYLHYOSCINE

### Marques de commerce et autres noms

Buscopan

### Type

Anticholinergique

### Voies d'administration

IV, orale (PO)

### Posologie et guide d'élimination (GE)

| #Chevaux | Produit  | Dose/Voie | Administration | GE   |
|----------|----------|-----------|----------------|------|
| 4        | Buscopan | 140 mg IV | unique         | 24 h |
| 4        | Buscopan | 140 mg PO | unique         | 24 h |

Souvenez-vous que ces résultats ne sont fournis qu'à titre d'indications. Ils ne s'appliquent pas nécessairement à chaque cheval auquel est administré ce médicament.

Les lignes directrices contenues dans la présente brochure ne s'appliquent pas nécessairement aux produits composés et ne sont pas nécessairement compatibles avec la réglementation ou les méthodes de laboratoire des pays étrangers.

Marques de commerce et autres noms

Kentucky Red

Type

Agent hémostatique

Voie d'administration

IV

Posologie et guide d'élimination (GE)

| #Chevaux | Produit      | Dose/Voie | Administration | GE   |
|----------|--------------|-----------|----------------|------|
| 4        | Kentucky Red | 100 mg IV | unique         | 24 h |

Souvenez-vous que ces résultats ne sont fournis qu'à titre d'indications. Ils ne s'appliquent pas nécessairement à chaque cheval auquel est administré ce médicament.

Les lignes directrices contenues dans la présente brochure ne s'appliquent pas nécessairement aux produits composés et ne sont pas nécessairement compatibles avec la réglementation ou les méthodes de laboratoire des pays étrangers.

# CARPROFÈNE

## Marques de commerce et autres noms

Rimadyl

## Type

Analgésique/Anti-inflammatoire (D.A.I.N.S)

## Voie d'administration

Orale (PO)

## Posologie et guide d'élimination (GE)

| #Chevaux | Produit | Dose/Voie | Administration   | GE     |
|----------|---------|-----------|------------------|--------|
| 4        | Rimadyl | 1 g PO    | 2x/jour, 5 jours | 120+ h |

**À cette dose, le dépistage chez la plupart des chevaux serait positif au-delà de 120 heures après le dernier traitement.**

Souvenez-vous que ces résultats ne sont fournis qu'à titre d'indications. Ils ne s'appliquent pas nécessairement à chaque cheval auquel est administré ce médicament.

Les lignes directrices contenues dans la présente brochure ne s'appliquent pas nécessairement aux produits composés et ne sont pas nécessairement compatibles avec la réglementation ou les méthodes de laboratoire des pays étrangers.

Marques de commerce et autres noms

Reactine

Type

Antihistaminique

Voie d'administration

Orale (PO)

Posologie et guide d'élimination (GE)

| #Chevaux | Produit  | Dose/Voie | Administration | GE   |
|----------|----------|-----------|----------------|------|
| 4        | Reactine | 200 mg PO | unique         | 72 h |

Souvenez-vous que ces résultats ne sont fournis qu'à titre d'indications. Ils ne s'appliquent pas nécessairement à chaque cheval auquel est administrée cette drogue.

Ces lignes directrices ne s'appliquent pas aux produits composés et ne sont pas nécessairement compatibles avec la réglementation ou les méthodes de laboratoire des pays étrangers.

# CHLOROPROCAÏNE

## Marques de commerce et autres noms

Nesacaïne

## Type

Anesthésique local

## Voie d'administration

INFIL

## Posologie et guide d'élimination (GE)

| #Chevaux | Produit   | Dose/Voie   | Administration | GE   |
|----------|-----------|-------------|----------------|------|
| 4        | Nesacaïne | 80 mg INFIL | unique         | 24 h |

Souvenez-vous que ces résultats ne sont fournis qu'à titre d'indications. Ils ne s'appliquent pas nécessairement à chaque cheval auquel est administré ce médicament.

Les lignes directrices contenues dans la présente brochure ne s'appliquent pas nécessairement aux produits composés et ne sont pas nécessairement compatibles avec la réglementation ou les méthodes de laboratoire des pays étrangers.

# CHLORPHÉNIRAMINE

## Marques de commerce et autres noms

Chlortripolon, Histalon, Novopheniram, Chlorophen, Inactihist

## Type

Antihistaminique

## Voie d'administration

IM

## Posologie et guide d'élimination (GE)

| #Chevaux | Produit    | Dose/Voie | Administration | GE   |
|----------|------------|-----------|----------------|------|
| 8        | Inactihist | 75 mg IM  | unique         | 72 h |

Souvenez-vous que ces résultats ne sont fournis qu'à titre d'indications. Ils ne s'appliquent pas nécessairement à chaque cheval auquel est administré ce médicament.

Les lignes directrices contenues dans la présente brochure ne s'appliquent pas nécessairement aux produits composés et ne sont pas nécessairement compatibles avec la réglementation ou les méthodes de laboratoire des pays étrangers.

## CHLORPROMAZINE

### Marques de commerce et autres noms

Largactil, Chlorpromanyl, Chlorprom, G-Promazine, Apo Chlorpromazine, Novochlorpromazine

### Type

Tranquillisant

### Voie d'administration

IM

### Posologie et guide d'élimination (GE)

| #Chevaux | Produit   | Dose/Voie | Administration | GE   |
|----------|-----------|-----------|----------------|------|
| 4        | Largactil | 100 mg IM | unique         | 96 h |

Souvenez-vous que ces résultats ne sont fournis qu'à titre d'indications. Ils ne s'appliquent pas nécessairement à chaque cheval auquel est administré ce médicament.

Les lignes directrices contenues dans la présente brochure ne s'appliquent pas nécessairement aux produits composés et ne sont pas nécessairement compatibles avec la réglementation ou les méthodes de laboratoire des pays étrangers.

Marques de commerce et autres noms

Tagamet, Peptol

Type

Antagoniste du récepteur H<sub>2</sub> de l'histamine

Voie d'administration

Orale (PO)

Posologie et guide d'élimination (GE)

| #Chevaux | Produit | Dose/Voie | Administration   | GE   |
|----------|---------|-----------|------------------|------|
| 4        | Tagamet | 4 g PO    | 2x/jour, 3 jours | 48 h |

Souvenez-vous que ces résultats ne sont fournis qu'à titre d'indications. Ils ne s'appliquent pas nécessairement à chaque cheval auquel est administré ce médicament.

Les lignes directrices contenues dans la présente brochure ne s'appliquent pas nécessairement aux produits composés et ne sont pas nécessairement compatibles avec la réglementation ou les méthodes de laboratoire des pays étrangers.

# CLENBUTÉROL

## Marques de commerce et autres noms

Ventipulmin

## Type

Bronchodilatateur

## Voie d'administration

Orale (PO)

## Posologie et guide d'élimination (GE)

| #Chevaux | Produit     | Dose/Voie     | Administration      | GE       |
|----------|-------------|---------------|---------------------|----------|
| 4        | Ventipulmin | 0.40 mg<br>PO | 2x/jour, 5<br>jours | 28 jours |

Souvenez-vous que ces résultats ne sont fournis qu'à titre d'indications. Ils ne s'appliquent pas nécessairement à chaque cheval auquel est administré ce médicament.

Les lignes directrices contenues dans la présente brochure ne s'appliquent pas nécessairement aux produits composés et ne sont pas nécessairement compatibles avec la réglementation ou les méthodes de laboratoire des pays étrangers.

## **CLODRONATE – peut être utilisé uniquement pour les chevaux de 4 ans ou plus**

### Marques de commerce et autres noms

Osphos

### Type

Bisphosphonate

### Voie d'administration

IM, trois points d'injection différents

### Posologie et guide d'élimination (GE)

| #Chevaux | Produit | Dose/Voie | Administration | GE       |
|----------|---------|-----------|----------------|----------|
| 5        | Osphos  | 720 mg IM | unique         | 30 jours |

Souvenez-vous que ces résultats ne sont fournis qu'à titre d'indications. Ils ne s'appliquent pas nécessairement à chaque cheval auquel est administré ce médicament.

Les lignes directrices contenues dans la présente brochure ne s'appliquent pas nécessairement aux produits composés et ne sont pas nécessairement compatibles avec la réglementation ou les méthodes de laboratoire des pays étrangers.

## CLOMIPRAMINE

### Marques de commerce et autres noms

Clomicalm

### Type

Antidépresseur

### Voie d'administration

Orale (PO)

### Posologie et guide d'élimination (GE)

| #Chevaux | Produit   | Dose/Voie    | Administration      | GE     |
|----------|-----------|--------------|---------------------|--------|
| 4        | Clomicalm | 500 mg<br>PO | 2x/jour, 4<br>jours | 120+ h |

**À cette dose, le dépistage chez la plupart des chevaux serait positif au-delà de 120 heures après le dernier traitement.**

Souvenez-vous que ces résultats ne sont fournis qu'à titre d'indications. Ils ne s'appliquent pas nécessairement à chaque cheval auquel est administré ce médicament.

Les lignes directrices contenues dans la présente brochure ne s'appliquent pas nécessairement aux produits composés et ne sont pas nécessairement compatibles avec la réglementation ou les méthodes de laboratoire des pays étrangers.

## CROMOGLYCATE

### Marques de commerce et autres noms

Cromovet, Cromolyn, Intal

### Type

Antiallergique respiratoire

### Voies d'administration

NEB, AER

### Posologie et guide d'élimination (GE)

| #Chevaux | Produit  | Dose/Voie | Administration   | GE   |
|----------|----------|-----------|------------------|------|
| 4        | Cromovet | 80 mg NEB | unique           | 24 h |
| 2        | Cromovet | 80 mg NEB | 1x/jour, 3 jours | 24 h |
| 4        | Intal    | 10 mg AER | unique           | 24 h |

Souvenez-vous que ces résultats ne sont fournis qu'à titre d'indications. Ils ne s'appliquent pas nécessairement à chaque cheval auquel est administré ce médicament.

Les lignes directrices contenues dans la présente brochure ne s'appliquent pas nécessairement aux produits composés et ne sont pas nécessairement compatibles avec la réglementation ou les méthodes de laboratoire des pays étrangers.

## CYPROHEPTADINE

### Marques de commerce et autres noms

Periactin

### Type

Antihistaminique

### Voie d'administration

Orale (PO)

### Posologie et guide d'élimination (GE)

| #Chevaux | Produit   | Dose/Voie | Administration   | GE   |
|----------|-----------|-----------|------------------|------|
| 4        | Periactin | 40 mg PO  | 1x/jour, 5 jours | 48 h |

Souvenez-vous que ces résultats ne sont fournis qu'à titre d'indications. Ils ne s'appliquent pas nécessairement à chaque cheval auquel est administré ce médicament.

Les lignes directrices contenues dans la présente brochure ne s'appliquent pas nécessairement aux produits composés et ne sont pas nécessairement compatibles avec la réglementation ou les méthodes de laboratoire des pays étrangers.

Marques de commerce et autres noms

Dantrium

Type

Relaxant musculaire

Voie d'administration

Orale (PO)

Posologie et guide d'élimination (GE)

| #Chevaux | Produit                           | Dose/Voie | Administration   | GE   |
|----------|-----------------------------------|-----------|------------------|------|
| 8        | Dantrium                          | 1 g PO    | unique           | 36 h |
| 4        | Suspension<br>orale<br>Dantrolène | 1 g PO    | 1x/jour, 5 jours | 60 h |

Souvenez-vous que ces résultats ne sont fournis qu'à titre d'indications. Ils ne s'appliquent pas nécessairement à chaque cheval auquel est administré ce médicament.

Les lignes directrices contenues dans la présente brochure ne s'appliquent pas nécessairement aux produits composés et ne sont pas nécessairement compatibles avec la réglementation ou les méthodes de laboratoire des pays étrangers.

## DEMBREXINE

### Marques de commerce et autres noms

Sputolysin

### Type

Mucolytique;Expectorant

### Voie d'administration

Orale (PO)

### Posologie et guide d'élimination (GE)

| #Chevaux | Produit    | Dose/Voie | Administration   | GE   |
|----------|------------|-----------|------------------|------|
| 4        | Sputolysin | 150 mg PO | unique           | 72 h |
| 4        | Sputolysin | 150 mg PO | 2x/jour, 4 jours | 72 h |

Souvenez-vous que ces résultats ne sont fournis qu'à titre d'indications. Ils ne s'appliquent pas nécessairement à chaque cheval auquel est administré ce médicament

Les lignes directrices contenues dans la présente brochure ne s'appliquent pas nécessairement aux produits composés et ne sont pas nécessairement compatibles avec la réglementation ou les méthodes de laboratoire des pays étrangers.

Marques de commerce et autres noms

Dormosedan

Type

Analgésique, Sédatif

Voie d'administration

IV, SL

Posologie et guide d'élimination (GE)

| #Chevaux | Produit    | Dose/Voie  | Administration | GE   |
|----------|------------|------------|----------------|------|
| 4        | Dormosedan | 5 mg IV    | unique         | 36 h |
| 4        | Dormosedan | 20 mg IV   | unique         | 72 h |
| 4        | Dormosedan | 22.8 mg SL | unique         | 72 h |

Souvenez-vous que ces résultats ne sont fournis qu'à titre d'indications. Ils ne s'appliquent pas nécessairement à chaque cheval auquel est administré ce médicament.

Les lignes directrices contenues dans la présente brochure ne s'appliquent pas nécessairement aux produits composés et ne sont pas nécessairement compatibles avec la réglementation ou les méthodes de laboratoire des pays étrangers.

## DEXAMÉTHASONE

### Marques de commerce et autres noms

Dexamethasone 5, Dexamethasone Powder

### Type

Antiinflammatoire;Corticostéroïde synthétique

### Voies d'administration

IV, Orale (PO)

### Posologie et guide d'élimination (GE)

| #Chevaux | Produit                 | Dose/Voie   | Administration      | GE   |
|----------|-------------------------|-------------|---------------------|------|
| 4        | Dexamethasone<br>5      | 25 mg IV    | unique              | 48 h |
| 4        | Dexamethasone<br>Powder | 10 mg<br>PO | 1x/jour, 5<br>jours | 48 h |

Souvenez-vous que ces résultats ne sont fournis qu'à titre d'indications. Ils ne s'appliquent pas nécessairement à chaque cheval auquel est administré ce médicament.

Les lignes directrices contenues dans la présente brochure ne s'appliquent pas nécessairement aux produits composés et ne sont pas nécessairement compatibles avec la réglementation ou les méthodes de laboratoire des pays étrangers.

# DEXTROMÉTHORPHANE

## Marques de commerce et autres noms

Demo-Cinéol, Sedatuss, Broncho-Grippol, Tussorphan, Robidex, Balminil

## Type

Antitussif

## Voie d'administration

Orale (PO)

## Posologie et guide d'élimination (GE)

| #Chevaux | Produit                     | Dose/Voie    | Administration | GE   |
|----------|-----------------------------|--------------|----------------|------|
| 4        | Sirop de dextro-méthorphane | 300 mg<br>PO | unique         | 96 h |

Souvenez-vous que ces résultats ne sont fournis qu'à titre d'indications. Ils ne s'appliquent pas nécessairement à chaque cheval auquel est administré ce médicament.

Les lignes directrices contenues dans la présente brochure ne s'appliquent pas nécessairement aux produits composés et ne sont pas nécessairement compatibles avec la réglementation ou les méthodes de laboratoire des pays étrangers.

## DIAZÉPAM

### Marques de commerce et autres noms

Valium

### Type

Tranquillisant

### Voies d'administration

IM, Orale (PO)

### Posologie et guide d'élimination (GE)

| #Chevaux | Produit         | Dose/Voie   | Administration      | GE        |
|----------|-----------------|-------------|---------------------|-----------|
| 4        | Valium          | 10 mg<br>IM | unique              | 120+<br>h |
| 4        | Apo<br>Diazépam | 30 mg<br>PO | 1x/jour, 5<br>jours | 120+<br>h |

**À cette dose, le dépistage chez la plupart des chevaux serait positif au-delà de 120 heures après le dernier traitement.**

Souvenez-vous que ces résultats ne sont fournis qu'à titre d'indications. Ils ne s'appliquent pas nécessairement à chaque cheval auquel est administré ce médicament.

Les lignes directrices contenues dans la présente brochure ne s'appliquent pas nécessairement aux produits composés et ne sont pas nécessairement compatibles avec la réglementation ou les méthodes de laboratoire des pays étrangers.

Marques de commerce et autres noms

Voltaren; Diclofénac Sodium Gel

Type

Analgésique/Anti-inflammatoire (D.A.I.N.S.)

Voies d'administration

Orale (PO), TOP (friction de la patte)

Posologie et guide d'élimination (GE)

| #Chevaux | Produit                     | Dose/Voie     | Administration   | GE    |
|----------|-----------------------------|---------------|------------------|-------|
| 8        | Voltaren                    | 500 mg PO     | unique           | 36 h  |
| 4        | Diclofénac<br>Sodium<br>gel | 180 mg<br>TOP | 2x/jour, 5 jours | 120 h |

Souvenez-vous que ces résultats ne sont fournis qu'à titre d'indications. Ils ne s'appliquent pas nécessairement à chaque cheval auquel est administré ce médicament.

Les lignes directrices contenues dans la présente brochure ne s'appliquent pas nécessairement aux produits composés et ne sont pas nécessairement compatibles avec la réglementation ou les méthodes de laboratoire des pays étrangers.

## DIFLUNISAL

### Marques de commerce et autres noms

Dolobid

### Type

Analgésique/Anti-inflammatoire (D.A.I.N.S.)

### Voie d'administration

Orale (PO)

### Posologie et guide d'élimination (GE)

| #Chevaux | Produit | Dose/Voie | Administration | GE   |
|----------|---------|-----------|----------------|------|
| 8        | Dolobid | 5 g PO    | unique         | 96 h |

Souvenez-vous que ces résultats ne sont fournis qu'à titre d'indications. Ils ne s'appliquent pas nécessairement à chaque cheval auquel est administré ce médicament.

Les lignes directrices contenues dans la présente brochure ne s'appliquent pas nécessairement aux produits composés et ne sont pas nécessairement compatibles avec la réglementation ou les méthodes de laboratoire des pays étrangers.

## DIMÉTHYLSULFOXYDE

### Marques de commerce et autres noms

DMSO, Domoso, Rimso, Kemsol

### Type

Analgésique/Anti-inflammatoire (D.A.I.N.S.); Adjuvant

### Voies d'administration

IV, TOP (friction de la patte)

### Posologie et guide d'élimination (GE)

| #Chevaux | Produit            | Dose/Voie     | Administration | GE   |
|----------|--------------------|---------------|----------------|------|
| 4        | Gel Domoso<br>90%  | 19.8 g<br>TOP | unique         | 36 h |
| 2        | Solution<br>Domoso | 19.8 g IV     | unique         | 36 h |

Souvenez-vous que ces résultats ne sont fournis qu'à titre d'indications. Ils ne s'appliquent pas nécessairement à chaque cheval auquel est administré ce médicament.

Les lignes directrices contenues dans la présente brochure ne s'appliquent pas nécessairement aux produits composés et ne sont pas nécessairement compatibles avec la réglementation ou les méthodes de laboratoire des pays étrangers.

## DIPHÉNHYDRAMINE

### Marques de commerce et autres noms

Banadryl, Sominex, Compoz, Nytol

### Type

Antihistaminique

### Voies d'administration

IM, orale (PO)

### Posologie et guide d'élimination (GE)

| #Chevaux | Produit  | Dose/Voie | Administration | GE   |
|----------|----------|-----------|----------------|------|
| 4        | Benadryl | 250 mg IM | unique         | 48 h |
| 4        | Benadryl | 500 mg PO | unique         | 48 h |

Souvenez-vous que ces résultats ne sont fournis qu'à titre d'indications. Ils ne s'appliquent pas nécessairement à chaque cheval auquel est administré ce médicament.

Les lignes directrices contenues dans la présente brochure ne s'appliquent pas nécessairement aux produits composés et ne sont pas nécessairement compatibles avec la réglementation ou les méthodes de laboratoire des pays étrangers.

Marques de commerce et autres noms

Methampyrone, Novolate, Diprone, Novin, Myovin,  
Dipyrone 50 %, Metamizol

Type

Analgésique, Antipyrétique

Voies d'administration

IM, IV

Posologie et guide d'élimination (GE)

| #Chevaux | Produit      | Dose/Voie | Administration   | GE    |
|----------|--------------|-----------|------------------|-------|
| 8        | Dipyrone 50% | 7.5 g IM  | unique           | 36 h  |
| 4        | Novolate     | 7.5 g IV  | unique           | 36 h  |
| 4        | Dipyrone 50% | 10 g IM   | 2x/jour, 5 jours | 120 h |

Souvenez-vous que ces résultats ne sont fournis qu'à titre d'indications. Ils ne s'appliquent pas nécessairement à chaque cheval auquel est administré ce médicament.

Les lignes directrices contenues dans la présente brochure ne s'appliquent pas nécessairement aux produits composés et ne sont pas nécessairement compatibles avec la réglementation ou les méthodes de laboratoire des pays étrangers.

## DYPHYLLINE

### Marques de commerce et autres noms

Protophylline

### Type

Bronchodilatateur

### Voie d'administration

Orale (PO)

### Posologie et guide d'élimination (GE)

| #Chevaux | Produit       | Dose/Voie | Administration | GE   |
|----------|---------------|-----------|----------------|------|
| 4        | Protophylline | 5 g PO    | unique         | 96 h |

Souvenez-vous que ces résultats ne sont fournis qu'à titre d'indications. Ils ne s'appliquent pas nécessairement à chaque cheval auquel est administré ce médicament.

Les lignes directrices contenues dans la présente brochure ne s'appliquent pas nécessairement aux produits composés et ne sont pas nécessairement compatibles avec la réglementation ou les méthodes de laboratoire des pays étrangers.

Marques de commerce et autres noms

Enacard

Type

Antihypertenseur

Voie d'administration

Orale (PO)

Posologie et guide d'élimination (GE)

| #Chevaux | Produit | Dose/Voie | Administration   | GE   |
|----------|---------|-----------|------------------|------|
| 4        | Enacard | 60 mg PO  | 1x/jour, 5 jours | 72 h |

Souvenez-vous que ces résultats ne sont fournis qu'à titre d'indications. Ils ne s'appliquent pas nécessairement à chaque cheval auquel est administré ce médicament.

Les lignes directrices contenues dans la présente brochure ne s'appliquent pas nécessairement aux produits composés et ne sont pas nécessairement compatibles avec la réglementation ou les méthodes de laboratoire des pays étrangers.

# ÉPHÉDRINE

## Marques de commerce et autres noms

Antiphrine, Anti-Histamine (contient pyriline)

## Type

Sympathomimétique, Anticongestif

## Voies d'administration

IM, orale (PO)

## Posologie et guide d'élimination (GE)

| #Chevaux | Produit                     | Dose/Voie    | Administration      | GE   |
|----------|-----------------------------|--------------|---------------------|------|
| 4        | Antiphrine                  | 200 mg<br>PO | unique              | 36 h |
| 4        | Anti-<br>Histamine          | 200 mg IM    | unique              | 36 h |
| 4        | Anti-<br>Histamine<br>Orale | 300 mg<br>PO | 2x/jour, 6<br>jours | 48 h |

Souvenez-vous que ces résultats ne sont fournis qu'à titre d'indications. Ils ne s'appliquent pas nécessairement à chaque cheval auquel est administré ce médicament.

Les lignes directrices contenues dans la présente brochure ne s'appliquent pas nécessairement aux produits composés et ne sont pas nécessairement compatibles avec la réglementation ou les méthodes de laboratoire des pays étrangers.

Marques de commerce et autres noms

Ergonovine (maléate)

Type

Ocytocique

Voie d'administration

IV

Posologie et guide d'élimination (GE)

| #Chevaux | Produit               | Dose/Voie | Administration | GE   |
|----------|-----------------------|-----------|----------------|------|
| 4        | Ergonovine<br>Maléate | 2 mg IV   | unique         | 36 h |
| 4        | Ergonovine<br>Maléate | 4 mg IV   | unique         | 60 h |

Souvenez-vous que ces résultats ne sont fournis qu'à titre d'indications. Ils ne s'appliquent pas nécessairement à chaque cheval auquel est administré ce médicament.

Les lignes directrices contenues dans la présente brochure ne s'appliquent pas nécessairement aux produits composés et ne sont pas nécessairement compatibles avec la réglementation ou les méthodes de laboratoire des pays étrangers.

# ÉTODOLAC

## Marques de commerce et autres noms

Ultradol

## Type

Analgésique/Anti-inflammatoire (D.A.I.N.S)

## Voie d'administration

Orale (PO)

## Posologie et guide d'élimination (GE)

| #Chevaux | Produit  | Dose/Voie | Administration | GE   |
|----------|----------|-----------|----------------|------|
| 4        | Ultradol | 2 g PO    | unique         | 96 h |

Souvenez-vous que ces résultats ne sont fournis qu'à titre d'indications. Ils ne s'appliquent pas nécessairement à chaque cheval auquel est administré ce médicament.

Les lignes directrices contenues dans la présente brochure ne s'appliquent pas nécessairement aux produits composés et ne sont pas nécessairement compatibles avec la réglementation ou les méthodes de laboratoire des pays étrangers.

Marques de commerce et autres noms

Pepcid, Ulcidine

TypeAntagoniste du récepteur H<sub>2</sub> de l'histamineVoie d'administration

Orale (PO)

Posologie et guide d'élimination (GE)

| #Chevaux | Produit | Dose/Voie | Administration | GE   |
|----------|---------|-----------|----------------|------|
| 4        | Pepcid  | 200 mg PO | unique         | 72 h |

Souvenez-vous que ces résultats ne sont fournis qu'à titre d'indications. Ils ne s'appliquent pas nécessairement à chaque cheval auquel est administré ce médicament.

Les lignes directrices contenues dans la présente brochure ne s'appliquent pas nécessairement aux produits composés et ne sont pas nécessairement compatibles avec la réglementation ou les méthodes de laboratoire des pays étrangers.

# FÉNOTÉROL

## Marques de commerce et autres noms

Berotec

## Type

Bronchodilatateur

## Voie d'administration

AER

## Posologie et guide d'élimination (GE)

| #Chevaux | Produit | Dose/Voie | Administration | GE   |
|----------|---------|-----------|----------------|------|
| 4        | Berotec | 1 mg AER  | unique         | 24 h |

Souvenez-vous que ces résultats ne sont fournis qu'à titre d'indications. Ils ne s'appliquent pas nécessairement à chaque cheval auquel est administré ce médicament.

Les lignes directrices contenues dans la présente brochure ne s'appliquent pas nécessairement aux produits composés et ne sont pas nécessairement compatibles avec la réglementation ou les méthodes de laboratoire des pays étrangers.

Marques de commerce et autres noms

Previcox

Type

Analgésique/Anti-inflammatoire (D.A.I.N.S.)

Voie d'administration

Orale (PO)

Posologie et guide d'élimination (GE)

| #Chevaux | Produit  | Dose/Voie | Administration   | GE       |
|----------|----------|-----------|------------------|----------|
| 4        | Previcox | 57 mg PO  | 1x/jour, 5 jours | 14 jours |

Souvenez-vous que ces résultats ne sont fournis qu'à titre d'indications. Ils ne s'appliquent pas nécessairement à chaque cheval auquel est administré ce médicament.

Les lignes directrices contenues dans la présente brochure ne s'appliquent pas nécessairement aux produits composés et ne sont pas nécessairement compatibles avec la réglementation ou les méthodes de laboratoire des pays étrangers.

# FLOCTAFÉNINE

## Marques de commerce et autres noms

Idarac

## Type

Analgésique/Anti-inflammatoire (D.A.I.N.S.)

## Voie d'administration

Orale (PO)

## Posologie et guide d'élimination (GE)

| #Chevaux | Produit | Dose/Voie | Administration | GE   |
|----------|---------|-----------|----------------|------|
| 4        | Idarac  | 2 g PO    | unique         | 96 h |

Souvenez-vous que ces résultats ne sont fournis qu'à titre d'indications. Ils ne s'appliquent pas nécessairement à chaque cheval auquel est administré ce médicament.

Les lignes directrices contenues dans la présente brochure ne s'appliquent pas nécessairement aux produits composés et ne sont pas nécessairement compatibles avec la réglementation ou les méthodes de laboratoire des pays étrangers.

Marques de commerce et autres noms

Banamine

Type

Analgésique/Anti-inflammatoire (D.A.I.N.S.)

Voies d'administration

Orale (PO), IV, IM

Posologie et guide d'élimination (GE)

| #Chevaux | Produit  | Dose/Voie | Administration   | GE   |
|----------|----------|-----------|------------------|------|
| 4        | Banamine | 500 mg PO | unique           | 48 h |
| 6        | Banamine | 500 mg IV | unique           | 48 h |
| 2        | Banamine | 500 mg IM | unique           | 72 h |
| 2        | Banamine | 500 mg IM | 1x/jour, 3 jours | 72 h |
| 2        | Banamine | 500 mg IM | 1x/jour, 5 jours | 72 h |

Souvenez-vous que ces résultats ne sont fournis qu'à titre d'indications. Ils ne s'appliquent pas nécessairement à chaque cheval auquel est administré ce médicament.

Les lignes directrices contenues dans la présente brochure ne s'appliquent pas nécessairement aux produits composés et ne sont pas nécessairement compatibles avec la réglementation ou les méthodes de laboratoire des pays étrangers.

## FLUPHÉNAZINE

### Marques de commerce et autres noms

Modecate

### Type

Sédatif/Tranquillisant

### Voie d'administration

IM

### Posologie et guide d'élimination (GE)

| #Chevaux | Produit  | Dose/Voie | Administration | GE       |
|----------|----------|-----------|----------------|----------|
| 4        | Modecate | 50 mg IM  | unique         | 42 jours |

Souvenez-vous que ces résultats ne sont fournis qu'à titre d'indications. Ils ne s'appliquent pas nécessairement à chaque cheval auquel est administré ce médicament.

Les lignes directrices contenues dans la présente brochure ne s'appliquent pas nécessairement aux produits composés et ne sont pas nécessairement compatibles avec la réglementation ou les méthodes de laboratoire des pays étrangers.

Marques de commerce et autres noms

Ansaid

Type

Analgésique/Anti-inflammatoire (D.A.I.N.S.)

Voie d'administration

Orale (PO)

Posologie et guide d'élimination (GE)

| #Chevaux | Produit | Dose/Voie | Administration | GE   |
|----------|---------|-----------|----------------|------|
| 4        | Ansaid  | 2 g PO    | unique         | 60 h |

Souvenez-vous que ces résultats ne sont fournis qu'à titre d'indications. Ils ne s'appliquent pas nécessairement à chaque cheval auquel est administré ce médicament.

Les lignes directrices contenues dans la présente brochure ne s'appliquent pas nécessairement aux produits composés et ne sont pas nécessairement compatibles avec la réglementation ou les méthodes de laboratoire des pays étrangers.

## FLUTICASONE

### Marques de commerce et autres noms

Flovent

### Type

Bronchodilatateur

### Voie d'administration

AER

### Posologie et guide d'élimination (GE)

| #Chevaux | Produit | Dose/Voie | Administration   | GE   |
|----------|---------|-----------|------------------|------|
| 5        | Flovent | 2 mg AER  | 2×/jour, 7 jours | 24 h |

Souvenez-vous que ces résultats ne sont fournis qu'à titre d'indications. Ils ne s'appliquent pas nécessairement à chaque cheval auquel est administrée cette drogue.

Ces lignes directrices ne s'appliquent pas aux produits composés et ne sont pas nécessairement compatibles avec la réglementation ou les méthodes de laboratoire des pays étrangers.

# FLUTICASONE/SALMÉTÉROL

## Marques de commerce et autres noms

Advair 250

## Type

Corticostéroïde synthétique; bronchodilatateur

## Voie d'administration

AER

## Posologie et guide d'élimination (GE)

:

| #Chevaux | Produit    | Dose/Voie            | Administration      | GE   |
|----------|------------|----------------------|---------------------|------|
| 5        | Advair 250 | 2,5 mg/250 µg<br>AER | 2×/jour,<br>7 jours | 24 h |

Souvenez-vous que ces résultats ne sont fournis qu'à titre d'indications. Ils ne s'appliquent pas nécessairement à chaque cheval auquel est administrée cette drogue.

Ces lignes directrices ne s'appliquent pas aux produits composés et ne sont pas nécessairement compatibles avec la réglementation ou les méthodes de laboratoire des pays étrangers.

## FUROSÉMIDE

### Marques de commerce et autres noms

Lasix, Salix, Lasix Special

### Type

Diurétique; Antihypertenseur

### Voies d'administration

IV, IM, orale (PO)

### Posologie et guide d'élimination (GE)

| #Chevaux | Produit          | Dose/Voie | Administration   | GE   |
|----------|------------------|-----------|------------------|------|
| 12       | Lasix            | 150 mg IV | unique           | 24 h |
| 2        | Lasix            | 200 mg IV | unique           | 24 h |
| 12       | Lasix            | 250 mg IV | unique           | 24 h |
| 4        | Lasix            | 400 mg IV | unique           | 24 h |
| 2        | Lasix            | 200 mg IV | 1x/jour, 3 jours | 24 h |
| 2        | Lasix            | 200 mg IM | unique           | 24 h |
| 4        | Lasix            | 400 mg IM | unique           | 24 h |
| 2        | Lasix            | 200 mg IM | 1x/jour, 3 jours | 24 h |
| 4        | Lasix<br>Special | 2 g PO    | unique           | 36 h |

Souvenez-vous que ces résultats ne sont fournis qu'à titre d'indications. Ils ne s'appliquent pas nécessairement à chaque cheval auquel est administré ce médicament.

Les lignes directrices contenues dans la présente brochure ne s'appliquent pas nécessairement aux produits composés et ne sont pas nécessairement compatibles avec la réglementation ou les méthodes de laboratoire des pays étrangers.

# GLYCOPYRROLATE

## Marques de commerce et autres noms

Robinul

## Type

Anticholinergique

## Voies d'administration

IV, IM

## Posologie et guide d'élimination (GE)

| #Chevaux | Produit | Dose/Voie | Administration | GE   |
|----------|---------|-----------|----------------|------|
| 4        | Robinul | 2 mg IV   | unique         | 36 h |
| 4        | Robinul | 2 mg IM   | unique         | 48 h |

Souvenez-vous que ces résultats ne sont fournis qu'à titre d'indications. Ils ne s'appliquent pas nécessairement à chaque cheval auquel est administré ce médicament.

Les lignes directrices contenues dans la présente brochure ne s'appliquent pas nécessairement aux produits composés et ne sont pas nécessairement compatibles avec la réglementation ou les méthodes de laboratoire des pays étrangers.

## GUAIFÉNÉSINE

### Marques de commerce et autres noms

Éther de Gaiacol et de Glycéryle, Gaiacolate de Glycéryle, Gecolate, Robitussin

### Type

Expectorant

### Voies d'administration

IV, orale (PO)

### Posologie et guide d'élimination (GE)

| #Chevaux | Produit                  | Dose/Voie | Administration | GE   |
|----------|--------------------------|-----------|----------------|------|
| 4        | Gecolate                 | 2 g IV    | unique         | 24 h |
| 4        | Sirop de<br>Guaifénésine | 2 g PO    | unique         | 24 h |

Souvenez-vous que ces résultats ne sont fournis qu'à titre d'indications. Ils ne s'appliquent pas nécessairement à chaque cheval auquel est administré ce médicament.

Les lignes directrices contenues dans la présente brochure ne s'appliquent pas nécessairement aux produits composés et ne sont pas nécessairement compatibles avec la réglementation ou les méthodes de laboratoire des pays étrangers.

# HYDROCHLOROTHIAZIDE

## Marques de commerce et autres noms

Vetazide, Hydro Aquil, Hydroduiril, Urozide, Edemol

## Type

Diurétique; Antihypertenseur

## Voies d'administration

IV, orale (PO)

## Posologie et guide d'élimination (GE)

| #Chevaux | Produit     | Dose/Voie | Administration | GE   |
|----------|-------------|-----------|----------------|------|
| 4        | Vetazide    | 100 mg IV | unique         | 60 h |
| 4        | Hydro Aquil | 225 mg PO | unique         | 60 h |

Souvenez-vous que ces résultats ne sont fournis qu'à titre d'indications. Ils ne s'appliquent pas nécessairement à chaque cheval auquel est administré ce médicament.

Les lignes directrices contenues dans la présente brochure ne s'appliquent pas nécessairement aux produits composés et ne sont pas nécessairement compatibles avec la réglementation ou les méthodes de laboratoire des pays étrangers.

## HYDROXYZINE

### Marques de commerce et autres noms

Hydroxyzine

### Type

Antihistaminique

### Voie d'administration

Orale (PO)

### Posologie et guide d'élimination (GE)

| #Chevaux | Produit     | Dose/Voie | Administration   | GE   |
|----------|-------------|-----------|------------------|------|
| 4        | Hydroxyzine | 500 mg PO | 2x/jour, 5 jours | 96 h |

Souvenez-vous que ces résultats ne sont fournis qu'à titre d'indications. Ils ne s'appliquent pas nécessairement à chaque cheval auquel est administré ce médicament.

Les lignes directrices contenues dans la présente brochure ne s'appliquent pas nécessairement aux produits composés et ne sont pas nécessairement compatibles avec la réglementation ou les méthodes de laboratoire des pays étrangers.

Marques de commerce et autres noms

Motrin

Type

Analgésique/Anti-inflammatoire (D.A.I.N.S.)

Voie d'administration

Orale (PO)

Posologie et guide d'élimination (GE)

| #Chevaux | Produit | Dose/Voie | Administration | GE   |
|----------|---------|-----------|----------------|------|
| 4        | Motrin  | 12 g PO   | unique         | 48 h |

Souvenez-vous que ces résultats ne sont fournis qu'à titre d'indications. Ils ne s'appliquent pas nécessairement à chaque cheval auquel est administré ce médicament.

Les lignes directrices contenues dans la présente brochure ne s'appliquent pas nécessairement aux produits composés et ne sont pas nécessairement compatibles avec la réglementation ou les méthodes de laboratoire des pays étrangers.

## INDAPAMIDE

### Marques de commerce et autres noms

Lozide

### Type

Diurétique, Antihypertenseur

### Voie d'administration

Orale (PO)

### Posologie et guide d'élimination (GE)

| #Chevaux | Produit | Dose/Voie | Administration | GE   |
|----------|---------|-----------|----------------|------|
| 4        | Lozide  | 40 mg PO  | unique         | 48 h |

Souvenez-vous que ces résultats ne sont fournis qu'à titre d'indications. Ils ne s'appliquent pas nécessairement à chaque cheval auquel est administré ce médicament.

Les lignes directrices contenues dans la présente brochure ne s'appliquent pas nécessairement aux produits composés et ne sont pas nécessairement compatibles avec la réglementation ou les méthodes de laboratoire des pays étrangers.

# INDOMÉTHACINE

## Marques de commerce et autres noms

Indocid, Infrocin, Novométhacine

## Type

Analgésique/Anti-inflammatoire (D.A.I.N.S.)

## Voie d'administration

Orale (PO)

## Posologie et guide d'élimination (GE)

| #Chevaux | Produit | Dose/Voie | Administration | GE   |
|----------|---------|-----------|----------------|------|
| 4        | Indocid | 1 g PO    | unique         | 48 h |

Souvenez-vous que ces résultats ne sont fournis qu'à titre d'indications. Ils ne s'appliquent pas nécessairement à chaque cheval auquel est administré ce médicament.

Les lignes directrices contenues dans la présente brochure ne s'appliquent pas nécessairement aux produits composés et ne sont pas nécessairement compatibles avec la réglementation ou les méthodes de laboratoire des pays étrangers.

# ISOFLUPRÉDONE

## Marques de commerce et autres noms

Predef 2X, 9-Fluoroprednisolone

## Type

Antiinflammatoire; Corticostéroïde synthétique

## Voie d'administration

IM

## Posologie et guide d'élimination (GE)

| #Chevaux | Produit   | Dose/Voie | Administration | GE   |
|----------|-----------|-----------|----------------|------|
| 4        | Predef 2X | 24 mg IM  | unique         | 48 h |

Souvenez-vous que ces résultats ne sont fournis qu'à titre d'indications. Ils ne s'appliquent pas nécessairement à chaque cheval auquel est administré ce médicament.

Les lignes directrices contenues dans la présente brochure ne s'appliquent pas nécessairement aux produits composés et ne sont pas nécessairement compatibles avec la réglementation ou les méthodes de laboratoire des pays étrangers.

Marques de commerce et autres noms

Ketaset, Ketalar, Vetalar

Type

Anesthésique général

Voie d'administration

IV

Posologie et guide d'élimination (GE)

| #Chevaux | Produit | Dose/Voie | Administration | GE   |
|----------|---------|-----------|----------------|------|
| 4        | Ketaset | 700 mg IV | unique         | 96 h |

Souvenez-vous que ces résultats ne sont fournis qu'à titre d'indications. Ils ne s'appliquent pas nécessairement à chaque cheval auquel est administré ce médicament.

Les lignes directrices contenues dans la présente brochure ne s'appliquent pas nécessairement aux produits composés et ne sont pas nécessairement compatibles avec la réglementation ou les méthodes de laboratoire des pays étrangers.

# KÉTOPROFÈNE

## Marques de commerce et autres noms

Ketofen, Anafen

## Type

Analgésique/Anti-inflammatoire (D.A.I.N.S.)

## Voie d'administration

IV

## Posologie et guide d'élimination (GE)

| #Chevaux | Produit | Dose/Voie | Administration | GE   |
|----------|---------|-----------|----------------|------|
| 4        | Anafen  | 1.2 g IV  | unique         | 48 h |

Souvenez-vous que ces résultats ne sont fournis qu'à titre d'indications. Ils ne s'appliquent pas nécessairement à chaque cheval auquel est administré ce médicament.

Les lignes directrices contenues dans la présente brochure ne s'appliquent pas nécessairement aux produits composés et ne sont pas nécessairement compatibles avec la réglementation ou les méthodes de laboratoire des pays étrangers.

Marques de commerce et autres noms

Zaditen

Type

Antiallergique respiratoire

Voie d'administration

Orale (PO)

Posologie et guide d'élimination (GE)

| #Chevaux | Produit | Dose/Voie | Administration | GE   |
|----------|---------|-----------|----------------|------|
| 4        | Zaditen | 20 mg PO  | unique         | 36 h |

Souvenez-vous que ces résultats ne sont fournis qu'à titre d'indications. Ils ne s'appliquent pas nécessairement à chaque cheval auquel est administré ce médicament.

Les lignes directrices contenues dans la présente brochure ne s'appliquent pas nécessairement aux produits composés et ne sont pas nécessairement compatibles avec la réglementation ou les méthodes de laboratoire des pays étrangers.

# LIDOCAÏNE

## Marques de commerce et autres noms

Lignocaïne, Xylocaïne, Duracaïne, Lido, Octocaïne, Lignospan

## Type

Anesthésique local

## Voies d'administration

INFIL, TOP (friction de la patte)

## Posologie et guide d'élimination (GE)

| #Chevaux | Produit        | Dose/Voie       | Administration | GE   |
|----------|----------------|-----------------|----------------|------|
| 4        | Lidocaïne pure | 150 mg<br>INFIL | unique         | 24 h |
| 4        | Lidocaïne pure | 500 mg<br>TOP*  | unique         | 36 h |

\*Note : Le traitement topique contient aussi 18 g DMSO.

Souvenez-vous que ces résultats ne sont fournis qu'à titre d'indications. Ils ne s'appliquent pas nécessairement à chaque cheval auquel est administré ce médicament.

Les lignes directrices contenues dans la présente brochure ne s'appliquent pas nécessairement aux produits composés et ne sont pas nécessairement compatibles avec la réglementation ou les méthodes de laboratoire des pays étrangers.

## Marques de commerce et autres noms

Metacam

## Type

Analgésique/Anti-inflammatoire (D.A.I.N.S)

## Voies d'administration

IV, orale (PO)

## Posologie et guide d'élimination (GE)

| #Chevaux | Produit | Dose/Voie | Administration | GE   |
|----------|---------|-----------|----------------|------|
| 4        | Metacam | 90 mg PO  | unique         | 48 h |
| 4        | Metacam | 270 mg IV | unique         | 54 h |

Souvenez-vous que ces résultats ne sont fournis qu'à titre d'indications. Ils ne s'appliquent pas nécessairement à chaque cheval auquel est administré ce médicament.

Les lignes directrices contenues dans la présente brochure ne s'appliquent pas nécessairement aux produits composés et ne sont pas nécessairement compatibles avec la réglementation ou les méthodes de laboratoire des pays étrangers.

# MEPIVACAÏNE

## Marques de commerce et autres noms

Carbocaïne

## Type

Anesthésique local

## Voies d'administration

IA, SC

## Posologie et guide d'élimination (GE)

| #Chevaux | Produit    | Dose/Voie | Administration | GE   |
|----------|------------|-----------|----------------|------|
| 4        | Carbocaïne | 300 mg IA | unique         | 48 h |
| 4        | Carbocaïne | 300 mg SC | unique         | 48 h |

Souvenez-vous que ces résultats ne sont fournis qu'à titre d'indications. Ils ne s'appliquent pas nécessairement à chaque cheval auquel est administré ce médicament.

Les lignes directrices contenues dans la présente brochure ne s'appliquent pas nécessairement aux produits composés et ne sont pas nécessairement compatibles avec la réglementation ou les méthodes de laboratoire des pays étrangers.

# MÉTHOCARBAMOL

## Marques de commerce et autres noms

Robaxin

## Type

Relaxant musculaire

## Voies d'administration

IV, orale (PO)

## Posologie et guide d'élimination (GE)

| #Chevaux | Produit | Dose/Voie | Administration                                  | GE   |
|----------|---------|-----------|---|------|
| 4        | Robaxin | 5 g IV    | unique  | 24 h |
| 4        | Robaxin | 5 g PO    | unique  | 24 h |
| 4        | Robaxin | 3 g PO    | 2x/jour pour 4 jours, 1x le 5 <sup>e</sup> jour | 48 h |

Souvenez-vous que ces résultats ne sont fournis qu'à titre d'indications. Ils ne s'appliquent pas nécessairement à chaque cheval auquel est administré ce médicament.

Les lignes directrices contenues dans la présente brochure ne s'appliquent pas nécessairement aux produits composés et ne sont pas nécessairement compatibles avec la réglementation ou les méthodes de laboratoire des pays étrangers.

# MÉTHYLPREDNISOLONE

## Marques de commerce et autres noms

Dépo Medrol

## Type

Antiinflammatoire; Corticostéroïde synthétique

## Voie d'administration

IA

## Posologie et guide d'élimination (GE)

| #Chevaux | Produit                 | Dose/Voie | Administration | GE       |
|----------|-------------------------|-----------|----------------|----------|
| 4        | Dépo medrol vétérinaire | 100 mg IA | unique         | 6 jours  |
| 4        | Dépo medrol vétérinaire | 200 mg IA | unique         | 14 jours |

Souvenez-vous que ces résultats ne sont fournis qu'à titre d'indications. Ils ne s'appliquent pas nécessairement à chaque cheval auquel est administré ce médicament.

Les lignes directrices contenues dans la présente brochure ne s'appliquent pas nécessairement aux produits composés et ne sont pas nécessairement compatibles avec la réglementation ou les méthodes de laboratoire des pays étrangers.

Marques de commerce et autres noms

Relafen

Type

Analgésique/Anti-inflammatoire (D.A.I.N.S)

Voie d'administration

Orale (PO)

Posologie et guide d'élimination (GE)

| #Chevaux | Produit | Dose/Voie | Administration | GE   |
|----------|---------|-----------|----------------|------|
| 4        | Relafen | 5 g PO    | unique         | 96 h |

Souvenez-vous que ces résultats ne sont fournis qu'à titre d'indications. Ils ne s'appliquent pas nécessairement à chaque cheval auquel est administré ce médicament.

Les lignes directrices contenues dans la présente brochure ne s'appliquent pas nécessairement aux produits composés et ne sont pas nécessairement compatibles avec la réglementation ou les méthodes de laboratoire des pays étrangers.

## NAPROXÈNE

### Marques de commerce et autres noms

Naprosyn, Equiproxen

### Type

Analgésique/Anti-inflammatoire (D.A.I.N.S.)

### Voie d'administration

Orale (PO)

### Posologie et guide d'élimination (GE)

| #Chevaux | Produit    | Dose/Voie | Administration   | GE    |
|----------|------------|-----------|------------------|-------|
| 4        | Naprosyn   | 4.5 g PO  | unique           | 96 h  |
| 4        | Equiproxen | 2 g PO    | 2x/jour, 5 jours | 120 h |

Souvenez-vous que ces résultats ne sont fournis qu'à titre d'indications. Ils ne s'appliquent pas nécessairement à chaque cheval auquel est administré ce médicament.

Les lignes directrices contenues dans la présente brochure ne s'appliquent pas nécessairement aux produits composés et ne sont pas nécessairement compatibles avec la réglementation ou les méthodes de laboratoire des pays étrangers.

Marques de commerce et autres noms

Tilade, Alocril

Type

Antiinflammatoire bronchiale; Antiallergique respiratoire

Voie d'administration

AER

Posologie et guide d'élimination (GE)

| #Chevaux | Produit | Dose/Voie | Administration | GE   |
|----------|---------|-----------|----------------|------|
| 4        | Tilade  | 16 mg AER | unique         | 24 h |

Souvenez-vous que ces résultats ne sont fournis qu'à titre d'indications. Ils ne s'appliquent pas nécessairement à chaque cheval auquel est administré ce médicament.

Les lignes directrices contenues dans la présente brochure ne s'appliquent pas nécessairement aux produits composés et ne sont pas nécessairement compatibles avec la réglementation ou les méthodes de laboratoire des pays étrangers.

## OXAPROZIN

### Marques de commerce et autres noms

Daypro

### Type

Analgésique/Anti-inflammatoire (D.A.I.N.S)

### Voie d'administration

Orale (PO)

### Posologie et guide d'élimination (GE)

| #Chevaux | Produit | Dose/Voie | Administration | GE        |
|----------|---------|-----------|----------------|-----------|
| 4        | Daypro  | 4.8 g PO  | unique         | 120+<br>h |

**À cette dose, le dépistage chez la plupart des chevaux serait positif au-delà de 120 heures après le dernier traitement.**

Souvenez-vous que ces résultats ne sont fournis qu'à titre d'indications. Ils ne s'appliquent pas nécessairement à chaque cheval auquel est administré ce médicament.

Les lignes directrices contenues dans la présente brochure ne s'appliquent pas nécessairement aux produits composés et ne sont pas nécessairement compatibles avec la réglementation ou les méthodes de laboratoire des pays étrangers.

Marques de commerce et autres noms

Talwin

Type

Analgésique

Voie d'administration

IM

Posologie et guide d'élimination (GE)

| #Chevaux | Produit | Dose/Voie | Administration | GE   |
|----------|---------|-----------|----------------|------|
| 4        | Talwin  | 300mg IM  | unique         | 72 h |

Souvenez-vous que ces résultats ne sont fournis qu'à titre d'indications. Ils ne s'appliquent pas nécessairement à chaque cheval auquel est administré ce médicament.

Les lignes directrices contenues dans la présente brochure ne s'appliquent pas nécessairement aux produits composés et ne sont pas nécessairement compatibles avec la réglementation ou les méthodes de laboratoire des pays étrangers.

## PENTOXIFYLLINE

### Marques de commerce et autres noms

Trental, Navicon

### Type

Vasodilateur

### Voie d'administration

Orale (PO)

### Posologie et guide d'élimination (GE)

| #Chevaux | Produit | Dose/Voie | Administration   | GE   |
|----------|---------|-----------|------------------|------|
| 4        | Trental | 4 g PO    | unique           | 48 h |
| 4        | Navicon | 2 g PO    | 2x/jour, 4 jours | 48 h |
| 4        | Navicon | 2 g PO    | 3x/jour, 5 jours | 48 h |

Souvenez-vous que ces résultats ne sont fournis qu'à titre d'indications. Ils ne s'appliquent pas nécessairement à chaque cheval auquel est administré ce médicament

Les lignes directrices contenues dans la présente brochure ne s'appliquent pas nécessairement aux produits composés et ne sont pas nécessairement compatibles avec la réglementation ou les méthodes de laboratoire des pays étrangers.

Marques de commerce et autres noms

Phénothiazine

Type

Antihelminthique

Voie d'administration

Orale (PO)

Posologie et guide d'élimination (GE)

| #Chevaux | Produit                                    | Dose/Voie | Administration | GE   |
|----------|--|-----------|----------------|------|
| 4        | Phénothiazine<br>Drench Grade<br>en poudre | 4.75 g PO | unique         | 96 h |

Souvenez-vous que ces résultats ne sont fournis qu'à titre d'indications. Ils ne s'appliquent pas nécessairement à chaque cheval auquel est administré ce médicament.

Les lignes directrices contenues dans la présente brochure ne s'appliquent pas nécessairement aux produits composés et ne sont pas nécessairement compatibles avec la réglementation ou les méthodes de laboratoire des pays étrangers.

## PHÉNYLBUTAZONE

### Marques de commerce et autres noms

Bute, Butazolidin, Dinz, Butazone, Equipalazone, Azrabute, Centrabute

### Type

Analgésique/Anti-inflammatoire (D.A.I.N.S.)

### Voies d'administration

IV, orale (PO)

### Posologie et guide d'élimination (GE)

| #Chevaux | Produit                      | Dose/Voie | Administration      | GE   |
|----------|------------------------------|-----------|---------------------|------|
| 2        | Phénylbutazone<br>Injectable | 2g IV     | unique              | 48h  |
| 2        | Phénylbutazone<br>Injectable | 2g IV     | 1x/jour,<br>5 jours | 48h  |
| 2        | Phénylbutazone<br>Injectable | 3 g IV    | unique              | 96 h |
| 2        | Phénylbutazone<br>Injectable | 3 g IV    | 1x/jour,<br>3 jours | 96 h |
| 2        | Bute                         | 3 g PO    | unique              | 96 h |
| 2        | Bute                         | 3 g PO    | 1x/jour,<br>3 jours | 96 h |

Souvenez-vous que ces résultats ne sont fournis qu'à titre d'indications. Ils ne s'appliquent pas nécessairement à chaque cheval auquel est administré ce médicament.

Les lignes directrices contenues dans la présente brochure ne s'appliquent pas nécessairement aux produits composés et ne sont pas nécessairement compatibles avec la réglementation ou les méthodes de laboratoire des pays étrangers.

Marques de commerce et autres noms

Dilantin, Suspension Phénytoïne

Type

Anticonvulsif

Voie d'administration

Orale (PO)

Posologie et guide d'élimination (GE)

| #Chevaux | Produit               | Dose/Voie | Administration   | GE   |
|----------|-----------------------|-----------|------------------|------|
| 4        | Suspension Phénytoïne | 3 g PO    | 2x/jour, 3 jours | 96 h |

Souvenez-vous que ces résultats ne sont fournis qu'à titre d'indications. Ils ne s'appliquent pas nécessairement à chaque cheval auquel est administré ce médicament.

Les lignes directrices contenues dans la présente brochure ne s'appliquent pas nécessairement aux produits composés et ne sont pas nécessairement compatibles avec la réglementation ou les méthodes de laboratoire des pays étrangers.

## PIROXICAME

### Marques de commerce et autres noms

Feldene

### Type

Analgésique/Anti-inflammatoire (D.A.I.N.S.)

### Voie d'administration

Orale (PO)

### Posologie et guide d'élimination (GE)

| #Chevaux | Produit | Dose/Voie | Administration | GE   |
|----------|---------|-----------|----------------|------|
| 4        | Feldene | 100 mg PO | unique         | 72 h |

Souvenez-vous que ces résultats ne sont fournis qu'à titre d'indications. Ils ne s'appliquent pas nécessairement à chaque cheval auquel est administré ce médicament.

Les lignes directrices contenues dans la présente brochure ne s'appliquent pas nécessairement aux produits composés et ne sont pas nécessairement compatibles avec la réglementation ou les méthodes de laboratoire des pays étrangers.

## Marques de commerce et autres noms

Solu Delta Cortef; succinate de sodium de prednisolone  
Acétate de prednisolone

## Type

Antiinflammatoire/Corticostéroïde synthétique

## Voie d'administration

IV, orale (PO)

## Posologie et guide d'élimination (GE)

| #Chevaux | Produit                 | Dose/Voie | Administration   | GE   |
|----------|-------------------------|-----------|------------------|------|
| 8        | Acétate de prednisolone | 400 mg PO | 2x/jour, 5 jours | 48 h |
| 4        | Solu Delta Cortef       | 500mg IV  | unique           | 48 h |
| 4        | Solu Delta Cortef       | 100 mg IV | unique           | 48 h |

Souvenez-vous que ces résultats ne sont fournis qu'à titre d'indications. Ils ne s'appliquent pas nécessairement à chaque cheval auquel est administré ce médicament.

Les lignes directrices contenues dans la présente brochure ne s'appliquent pas nécessairement aux produits composés et ne sont pas nécessairement compatibles avec la réglementation ou les méthodes de laboratoire des pays étrangers.

## PREDNISONNE

### Marques de commerce et autres noms

Deltasone

### Type

Antiinflammatoire; Corticostéroïde synthétique

### Voie d'administration

Orale (PO)

### Posologie et guide d'élimination (GE)

| #Chevaux | Produit   | Dose/Voie | Administration | GE   |
|----------|-----------|-----------|----------------|------|
| 4        | Deltasone | 1 g PO    | unique         | 48 h |

Souvenez-vous que ces résultats ne sont fournis qu'à titre d'indications. Ils ne s'appliquent pas nécessairement à chaque cheval auquel est administré ce médicament.

Les lignes directrices contenues dans la présente brochure ne s'appliquent pas nécessairement aux produits composés et ne sont pas nécessairement compatibles avec la réglementation ou les méthodes de laboratoire des pays étrangers.

# HYDROCHLORURE DE PROCAÏNE

## Marques de commerce et autres noms

Novocaïne

## Type

Anesthésique local

## Voie d'administration

INFIL

## Posologie et guide d'élimination (GE)

| #Chevaux | Produit   | Dose/Voie     | Administration | GE   |
|----------|-----------|---------------|----------------|------|
| 4        | Novocaïne | 80 mg INFIL   | unique         | 48 h |
| 4        | Novocaïne | 120 mg INFIL  | unique         | 48 h |
| 4        | Novocaïne | 160 mg INFIL  | unique         | 48 h |
| 4        | Novocaïne | 200 mg INFIL  | unique         | 48 h |
| 4        | Novocaïne | 1600 mg INFIL | unique         | 48 h |

Souvenez-vous que ces résultats ne sont fournis qu'à titre d'indications. Ils ne s'appliquent pas nécessairement à chaque cheval auquel est administré ce médicament.

Les lignes directrices contenues dans la présente brochure ne s'appliquent pas nécessairement aux produits composés et ne sont pas nécessairement compatibles avec la réglementation ou les méthodes de laboratoire des pays étrangers.

## PÉNICILLINE G PROCAÏNE

### Marques de commerce et autres noms

Derapen-A, Azimycine, Cillimycine, Penamycine, Suspension PenStrep, Pen DI Strep, Éthacilline, Diathal, Prémélange Pro-Pen, Formule spéciale 17900; autres

### Type

Antibiotique (contient un anesthésique local : Procaïne)

### Voies d'administration

IM, orale (PO), TOP

### Posologie et guide d'élimination (GE)

| #Chevaux | Produit                 | Dose/Voie           | Administration      | GE    |
|----------|-------------------------|---------------------|---------------------|-------|
| 4        | Derapen A               | 2 million<br>IU* IM | unique              | 425 h |
| 4        | Azimycin                | 4 million<br>IU IM  | unique              | 425 h |
| 4        | Cillimycin              | 4 million<br>IU IM  | unique              | 425 h |
| 4        | Penamycin               | 4 million<br>IU IM  | unique              | 425 h |
| 4        | Suspension<br>Pen-Strep | 4 million<br>IU IM  | unique              | 425 h |
| 4        | Pen Di<br>Strep         | 4 million<br>IU IM  | unique              | 425 h |
| 4        | Pen Di<br>Strep         | 4 million<br>IU IM  | 1x/jour, 5<br>jours | 425 h |

\*UI = Unités internationales (1 million UI pénicilline G procaïne contiennent 424 mg procaïne)

...continué sur la page suivante

## PÉNICILLINE G PROCAÏNE (suite)

Voir aussi p. 106

| #Chevaux | Produit                      | Dose/Voie             | Administration | GE    |
|----------|------------------------------|-----------------------|----------------|-------|
| 4        | Éthacillin                   | 6 million<br>IU IM    | unique         | 425 h |
| 4        | Diathal**                    | 2 million<br>IU IM    | unique         | 425 h |
| 4        | Prémélange<br>Pro-Pen        | 4 million<br>IU PO    | unique         | 60 h  |
| 4        | Formule<br>Spéciale<br>17900 | 0.2 million<br>IU TOP | unique         | 48 h  |

\*\*Contient également 200 mg hydrochlorure de procaïne

Souvenez-vous que ces résultats ne sont fournis qu'à titre d'indications. Ils ne s'appliquent pas nécessairement à chaque cheval auquel est administré ce médicament.

Les lignes directrices contenues dans la présente brochure ne s'appliquent pas nécessairement aux produits composés et ne sont pas nécessairement compatibles avec la réglementation ou les méthodes de laboratoire des pays étrangers.

## PYRILAMINE

### Marques de commerce et autres noms

Histosol, Anti-Histamine (contient éphédrine)

### Type

Antihistaminique

### Voies d'administration

IM, orale (PO)

### Posologie et guide d'élimination (GE)

| #Chevaux | Produit            | Dose/Voie    | Administration      | GE   |
|----------|--------------------|--------------|---------------------|------|
| 4        | Histosol           | 500 mg<br>IM | unique              | 36 h |
| 4        | Anti-<br>Histamine | 750 mg<br>PO | 2x/jour, 6<br>jours | 36 h |

Souvenez-vous que ces résultats ne sont fournis qu'à titre d'indications. Ils ne s'appliquent pas nécessairement à chaque cheval auquel est administré ce médicament.

Les lignes directrices contenues dans la présente brochure ne s'appliquent pas nécessairement aux produits composés et ne sont pas nécessairement compatibles avec la réglementation ou les méthodes de laboratoire des pays étrangers.

Marques de commerce et autres noms

Zantac

Type

Antagoniste du récepteur H<sub>2</sub> de l'histamine

Voie d'administration

Orale (PO)

Posologie et guide d'élimination (GE)

| #Chevaux | Produit | Dose/Voie | Administration   | GE   |
|----------|---------|-----------|------------------|------|
| 4        | Zantac  | 3 g PO    | 2x/jour, 4 jours | 48 h |

Souvenez-vous que ces résultats ne sont fournis qu'à titre d'indications. Ils ne s'appliquent pas nécessairement à chaque cheval auquel est administré ce médicament.

Les lignes directrices contenues dans la présente brochure ne s'appliquent pas nécessairement aux produits composés et ne sont pas nécessairement compatibles avec la réglementation ou les méthodes de laboratoire des pays étrangers.

## RESERPINE

### Marques de commerce et autres noms

Reserpine

### Type

Tranquillisant

### Voie d'administration

IM

### Posologie et guide d'élimination (GE)

| #Chevaux | Produit   | Dose/Voie | Administration | GE         |
|----------|-----------|-----------|----------------|------------|
| 4        | Reserpine | 2.5 mg IM | unique         | 7<br>jours |

Souvenez-vous que ces résultats ne sont fournis qu'à titre d'indications. Ils ne s'appliquent pas nécessairement à chaque cheval auquel est administré ce médicament.

Les lignes directrices contenues dans la présente brochure ne s'appliquent pas nécessairement aux produits composés et ne sont pas nécessairement compatibles avec la réglementation ou les méthodes de laboratoire des pays étrangers.

Marques de commerce et autres noms

Sedivet

Type

Sédatif

Voie d'administration

IV

Posologie et guide d'élimination (GE)

| #Chevaux | Produit | Dose/Voie | Administration | GE   |
|----------|---------|-----------|----------------|------|
| 4        | Sedivet | 20 mg IV  | unique         | 36 h |
| 4        | Sedivet | 50 mg IV  | unique         | 36 h |

Souvenez-vous que ces résultats ne sont fournis qu'à titre d'indications. Ils ne s'appliquent pas nécessairement à chaque cheval auquel est administré ce médicament.

Les lignes directrices contenues dans la présente brochure ne s'appliquent pas nécessairement aux produits composés et ne sont pas nécessairement compatibles avec la réglementation ou les méthodes de laboratoire des pays étrangers.

## SALBUTAMOL

### Marques de commerce et autres noms

Ventolin

### Type

Bronchodilatateur

### Voie d'administration

AER

### Posologie et guide d'élimination (GE)

| #Chevaux | Produit  | Dose/Voie  | Administration | GE   |
|----------|----------|------------|----------------|------|
| 4        | Ventolin | 0.8 mg AER | unique         | 24 h |

Souvenez-vous que ces résultats ne sont fournis qu'à titre d'indications. Ils ne s'appliquent pas nécessairement à chaque cheval auquel est administré ce médicament.

Les lignes directrices contenues dans la présente brochure ne s'appliquent pas nécessairement aux produits composés et ne sont pas nécessairement compatibles avec la réglementation ou les méthodes de laboratoire des pays étrangers.

Marques de commerce et autres noms

Serevent

Type

Bronchodilatateur

Voie d'administration

AER

Posologie et guide d'élimination (GE)

| #Chevaux | Produit  | Dose/Voie   | Administration | GE   |
|----------|----------|-------------|----------------|------|
| 4        | Serevent | 0.25 mg AER | unique         | 24 h |

Souvenez-vous que ces résultats ne sont fournis qu'à titre d'indications. Ils ne s'appliquent pas nécessairement à chaque cheval auquel est administré ce médicament.

Les lignes directrices contenues dans la présente brochure ne s'appliquent pas nécessairement aux produits composés et ne sont pas nécessairement compatibles avec la réglementation ou les méthodes de laboratoire des pays étrangers.

## SULINDAC

### Marques de commerce et autres noms

Clinoril

### Type

Analgésique/Anti-inflammatoire (D.A.I.N.S.)

### Voie d'administration

Orale (PO)

### Posologie et guide d'élimination (GE)

| #Chevaux | Produit  | Dose/Voie | Administration | GE   |
|----------|----------|-----------|----------------|------|
| 4        | Clinoril | 1.0 g PO  | unique         | 96 h |

Souvenez-vous que ces résultats ne sont fournis qu'à titre d'indications. Ils ne s'appliquent pas nécessairement à chaque cheval auquel est administré ce médicament

Les lignes directrices contenues dans la présente brochure ne s'appliquent pas nécessairement aux produits composés et ne sont pas nécessairement compatibles avec la réglementation ou les méthodes de laboratoire des pays étrangers.

## Marques de commerce et autres noms

Mobiflex

## Type

Analgésique/Anti-inflammatoire (D.A.I.N.S)

## Voie d'administration

Orale (PO)

## Posologie et guide d'élimination (GE)

| #Chevaux | Produit  | Dose/Voie | Administration | GE   |
|----------|----------|-----------|----------------|------|
| 4        | Mobiflex | 200 mg PO | unique         | 48 h |

Souvenez-vous que ces résultats ne sont fournis qu'à titre d'indications. Ils ne s'appliquent pas nécessairement à chaque cheval auquel est administré ce médicament.

Les lignes directrices contenues dans la présente brochure ne s'appliquent pas nécessairement aux produits composés et ne sont pas nécessairement compatibles avec la réglementation ou les méthodes de laboratoire des pays étrangers.

## TERBUTALINE

### Marques de commerce et autres noms

Bricanyl, Brethine

### Type

Bronchodilatateur

### Voies d'administration

Orale (PO), SC

### Posologie et guide d'élimination (GE)

| #Chevaux | Produit  | Dose/Voie | Administration | GE   |
|----------|----------|-----------|----------------|------|
| 4        | Brethine | 1 mg SC   | unique         | 72 h |
| 4        | Bricanyl | 40 mg PO  | unique         | 72 h |

Souvenez-vous que ces résultats ne sont fournis qu'à titre d'indications. Ils ne s'appliquent pas nécessairement à chaque cheval auquel est administré ce médicament.

Les lignes directrices contenues dans la présente brochure ne s'appliquent pas nécessairement aux produits composés et ne sont pas nécessairement compatibles avec la réglementation ou les méthodes de laboratoire des pays étrangers.

# THÉOPHYLLINE

## Marques de commerce et autres noms

Aminophylline : Somophyllin, Aminophyl, Corophyllin, Phyllocontin

Théophylline : Acet-Am, Quibron, Asthmophylline, Theolair

## Type

Bronchodilatateur

## Voie d'administration

IV

## Posologie et guide d'élimination (GE)

| #Chevaux | Produit       | Dose/Voie | Administration | GE   |
|----------|---------------|-----------|----------------|------|
| 4        | Aminophylline | 1.5 g IV  | unique         | 96 h |

Souvenez-vous que ces résultats ne sont fournis qu'à titre d'indications. Ils ne s'appliquent pas nécessairement à chaque cheval auquel est administré ce médicament.

Les lignes directrices contenues dans la présente brochure ne s'appliquent pas nécessairement aux produits composés et ne sont pas nécessairement compatibles avec la réglementation ou les méthodes de laboratoire des pays étrangers.

## TRIAMCINOLONE (ACÉTONIDE)

### Marques de commerce et autres noms

Kenalog-10

### Type

Antiinflammatoire/Corticostéroïde synthétique

### Voies d'administration

IA

### Posologie et guide d'élimination (GE)

| #Chevaux | Produit    | Dose/Voie   | Administration | GE      |
|----------|------------|-------------|----------------|---------|
| 4        | Kenalog-10 | 20 mg<br>IA | unique         | 6 jours |

Souvenez-vous que ces résultats ne sont fournis qu'à titre d'indications. Ils ne s'appliquent pas nécessairement à chaque cheval auquel est administré ce médicament.

Les lignes directrices contenues dans la présente brochure ne s'appliquent pas nécessairement aux produits composés et ne sont pas nécessairement compatibles avec la réglementation ou les méthodes de laboratoire des pays étrangers.

# TRICHLORMÉTHIAZIDE

## Marques de commerce et autres noms

Naquasone

## Type

Diurétique; Antihypertenseur

## Voies d'administration

Orale (PO), IV, IM

## Posologie et guide d'élimination (GE)

| #Chevaux | Produit   | Dose/Voie | Administration | GE   |
|----------|-----------|-----------|----------------|------|
| 4        | Naquasone | 100 mg PO | unique         | 24 h |
| 4        | Naquasone | 200 mg PO | unique         | 24 h |
| 4        | Naquasone | 100 mg IV | unique         | 24 h |
| 4        | Naquasone | 100 mg IM | unique         | 36 h |

Souvenez-vous que ces résultats ne sont fournis qu'à titre d'indications. Ils ne s'appliquent pas nécessairement à chaque cheval auquel est administré ce médicament.

Les lignes directrices contenues dans la présente brochure ne s'appliquent pas nécessairement aux produits composés et ne sont pas nécessairement compatibles avec la réglementation ou les méthodes de laboratoire des pays étrangers.

## TRIPÉLENNAMINE

### Marques de commerce et autres noms

Vetastim

### Type

Antihistaminique

### Voie d'administration

IM

### Posologie et guide d'élimination (GE)

| #Chevaux | Produit  | Dose/Voie | Administration | GE   |
|----------|----------|-----------|----------------|------|
| 4        | Vetastim | 400 mg IM | unique         | 36 h |

Souvenez-vous que ces résultats ne sont fournis qu'à titre d'indications. Ils ne s'appliquent pas nécessairement à chaque cheval auquel est administré ce médicament.

Les lignes directrices contenues dans la présente brochure ne s'appliquent pas nécessairement aux produits composés et ne sont pas nécessairement compatibles avec la réglementation ou les méthodes de laboratoire des pays étrangers.

Marques de commerce et autres noms

Quadrisol

Type

Analgésique/Anti-inflammatoire (D.A.I.N.S)

Voies d'administration

Orale (PO), IV

Posologie et guide d'élimination (GE)

| #Chevaux | Produit   | Dose/Voie | Administration  | GE   |
|----------|-----------|-----------|---|------|
| 4        | Quadrisol | 1 g PO    | 1x/jour jours<br>1 & 5, 0.5 g<br>2x/jour jours<br>2-4 | 48 h |
| 4        | Quadrisol | 1 g IV    | unique  | 48 h |

Souvenez-vous que ces résultats ne sont fournis qu'à titre d'indications. Ils ne s'appliquent pas nécessairement à chaque cheval auquel est administré ce médicament.

Les lignes directrices contenues dans la présente brochure ne s'appliquent pas nécessairement aux produits composés et ne sont pas nécessairement compatibles avec la réglementation ou les méthodes de laboratoire des pays étrangers.

## XYLAZINE

### Marques de commerce et autres noms

Rompun

### Type

Relaxant musculaire; Analgésique; Sédatif

### Voie d'administration

IV

### Posologie et guide d'élimination (GE)

| #Chevaux | Produit | Dose/Voie | Administration | GE   |
|----------|---------|-----------|----------------|------|
| 4        | Rompun  | 500 mg IV | unique         | 24 h |

Souvenez-vous que ces résultats ne sont fournis qu'à titre d'indications. Ils ne s'appliquent pas nécessairement à chaque cheval auquel est administré ce médicament.

Les lignes directrices contenues dans la présente brochure ne s'appliquent pas nécessairement aux produits composés et ne sont pas nécessairement compatibles avec la réglementation ou les méthodes de laboratoire des pays étrangers.

Marques de commerce et autres noms

Zomax

Type

Analgésique/Anti-inflammatoire (D.A.I.N.S.)

Voie d'administration

Orale (PO)

Posologie et guide d'élimination (GE)

| #Chevaux | Produit | Dose/Voie | Administration   | GE   |
|----------|---------|-----------|------------------|------|
| 2        | Zomax   | 0.5 g PO  | unique           | 96 h |
| 2        | Zomax   | 0.5 g PO  | 1x/jour, 3 jours | 96 h |
| 2        | Zomax   | 1 g PO    | unique           | 96 h |
| 2        | Zomax   | 1 g PO    | 1x/jour, 3 jours | 96 h |

Souvenez-vous que ces résultats ne sont fournis qu'à titre d'indications. Ils ne s'appliquent pas nécessairement à chaque cheval auquel est administré ce médicament.

Les lignes directrices contenues dans la présente brochure ne s'appliquent pas nécessairement aux produits composés et ne sont pas nécessairement compatibles avec la réglementation ou les méthodes de laboratoire des pays étrangers.

**DROGUE:** Acide salicylique

Acide acétylsalicylique (AAS, Aspirine)

Salicylate de méthyle

**TYPE DE DROGUE:** Antipyrétique/analgésique/antiinflammatoire (D.A.I.NS): AAS; Révulsif; Salicylate de méthyle; kératolytique; acide salicylique

**MARQUES DE COMMERCE:** Acetophen, Entrophen, Aspir (AAS), Gel Baumodyne, Equine Blue Lotion; autres (salicylate de méthyle)

| ADMINISTRATION<br>DU MÉDICAMENT | PRÉSENTATION<br>D'ADMINISTRATION | POSOLOGIE ET VOIE | NOMBRE |         | TAUX D'ACIE SALICYLIQUE |
|---------------------------------|----------------------------------|-------------------|--------|---------|-------------------------|
|                                 |                                  |                   | DE.    | CHEVAUX |                         |
| Acide acétylsalicylique         | Acetophen                        | 11.7 g Orale      | 12     |         | 24 h*                   |
| Salicylate de méthyle           | Gel Baumodyne                    | 8.38 g Topique    | 8      |         | 6 h                     |
| Salicylate de méthyle           | Gel Baumadyne                    | 3.35 g Topique    | 8      |         | taux nil                |

\* Au cours de cette expérience, on a également détecté de l'acide acétylsalicylique dans l'urine de cheval jusqu'à 14 heures après l'administration.

On n'a observe aucun taux supérieur à 750 µg/mL dans l'urine ou à 6.5 µg/mL dans le sang à la suite d'administration d'aliments pour bétail.

Tous les résultats ci-dessus ont été obtenus au cours d'expériences et d'analyses d'urine de cheval effectuées en utilisant les méthodes courantes. Nous soulignons que ces résultats ne sont fournis qu'à titre d'indications. Ils ne s'appliquent pas nécessairement à chaque cheval auquel est administré une drogue métabolisée en acide salicylique.

## NOTES EXPLICATIVES

### A. ANNEXE

La présence des substances suivantes est interdite dans un échantillon officiel.

1. Toute substance pour laquelle les autorités n'ont pas autorisé l'utilisation en médecine vétérinaire (y compris tous les médicaments humains et tous les produits de l'étranger).
2. Toute substance de la liste (y compris certaines substances pour lesquelles les autorités ont autorisé l'utilisation en médecine vétérinaire).
3. Toute substance qui peut compromettre l'analyse des échantillons officiels visant le dépistage des substances mentionnées en annexe.
4. Toute substance pour laquelle les autorités ont délivré récemment une autorisation de 240 jours, et toute substance dont l'autorisation a été annulée.

|  |
|--|
| <b>IMPORTANT</b>   |
| Chaque produit pharmaceutique qui a reçu l'autorisation de vente au Canada a un « numéro d'identification de drogue » (N.I.D.) qui est inscrit sur l'étiquette du produit. |
| L'étiquette des médicaments pour utilisation en médecine vétérinaire porte la mention: « (Pour) Usage vétérinaire seulement » ou « (Pour) Usage agricole seulement ».      |
| <b>LISEZ ATTENTIVEMENT LES ÉTIQUETTES DES PRODUITS</b>   |

Les directives contenues dans la présente brochure ne sont pas nécessairement compatibles avec la réglementation ou les méthodes de laboratoire des pays étrangers.

Un seuil quantitatif a été établi pour certaines substances. Un échantillon officiel ne sera positif que si la concentration de ces substances est supérieure au seuil quantitatif et qu'il se conforme à tout autre règlement pertinent. Par exemple, voir l'alinéa B (ci-dessous).

## B. PÉNICILLINE G PROCAÏNE

Dans certaines conditions, l'analyse quantitative d'un échantillon de sang peut servir à classer un résultat positif ou négatif du dépistage de la procaïne suite à l'administration de produits contenant de la pénicilline G procaïne.

Les conditions sont les suivantes :

1. Si l'administration finale d'un produit contenant de la pénicilline G procaïne à une dose allant jusqu'à 6 millions UI a eu lieu au moins 48 heures avant l'heure prévue du début de la course à laquelle doit participer le cheval.
2. Si l'administration finale d'un produit contenant de la pénicilline G procaïne à une dose allant jusqu'à 9 millions UI a eu lieu au moins 96 heures avant l'heure prévue du début de la course à laquelle doit participer le cheval. Les dosages excédant 9 millions UI peuvent exiger un plus long retrait que 96 heures.
3. Si des procédures autorisées ont été mises en place pour avertir les agents provinciaux et le personnel de prélèvement.
4. Si des procédures autorisées ont été mises en place pour prélever un échantillon de sang.
5. Si une déclaration a été faite et un échantillon de sang fourni conformément à l'article 170 du *Règlement sur la surveillance du pari mutuel*.

Si toutes les conditions sont respectées, l'échantillon positif ne sera pas reconnu comme contenant de la procaïne, à moins que la concentration dans le sang n'excède 0,025 µg/mL ou 25ng/mL, tel que décrit au paragraphe 3, de l'annexe.

*Nous soulignons que ces résultats ne sont fournis qu'à titre d'indications. Ils ne s'appliquent pas nécessairement à chaque cheval auquel est administré ce médicament. Agriculture et Agroalimentaire Canada n'est nullement responsable si les résultats ne sont pas les mêmes que ceux qui sont présentés ici.*